



EPÓNIMOS EN
ANGIOLOGÍA Y
CIRUGÍA
VASCULAR

Laia Guillem

- **Signos**
- **Síndromes**
- **Enfermedades**



EPÓNIMOS EN ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

- **Signos**
- **Síndromes**
- **Enfermedades**

Título: Epónimos en Angiología y Cirugía Vascolar

Autor: Laia Guillem Martínez

Médico de Urgencias Hospital Comarcal de Viladecans. Barcelona

2005 © Manel Tort. Barcelona (O.T.: 5024)

e-mail: maneltort@auna.com

Ninguna parte de esta obra, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse, almacenarse o transmitirse de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la previa autorización escrita por parte de la editorial.

Prólogo

El término “epónimo” deriva de las palabras griegas επι (sobre) y ονομα (nombre), y con el mismo se designaba en la antigua Grecia al arconte que daba su nombre al año que se iniciaba.

En la Edad Media se utilizó para designar a aquellas personas que por sus méritos o gestas épicas asociaron su nombre al de un lugar o al de una época.

Los textos de Medicina son muy prolíficos en epónimos y que son ya indisociables de las prolíficas memorizaciones que las generaciones de médicos surgidas entre los años cincuenta y ochenta tuvimos que realizar.

La dinámica actual, tanto en el estudio como en el ejercicio de la Medicina, ha comportado que la utilización de epónimos tenga en la actualidad una menor relevancia.

En todo caso, y más allá de la erudición de los profesionales que lo utilizan, el epónimo sigue constituyendo un reconocimiento a la inquietud y a la capacidad de observación de las personas a quienes hace referencia.

Con esta monografía de “Epónimos en Angiología y Cirugía Vascul ar” se amplía la iniciativa emprendida en su día por los Dres. José Antonio Jiménez Cossío y José Antonio Gutiérrez del Manzano con la publicación de los “Diccionarios de Angiología y Cirugía Vascul ar”, motivo por el cual cabe felicitar a la Compañía Farmacéutica Faes Farma por su edición.

Dr. Josep Marinel·lo Roura
*Presidente del Capitulo Español
de Flebologia de la SEACV*

Barcelona, abril de 2005

A

- p.5 **Adamkiewicz**, arteria de
Adams-DeWeese, clip de
Adson, maniobra de
Adson-Caffey, síndrome
Allen, maniobra de
Allen, test de
Allen y Brown, criterios de
Allis, pinza de
Amussat, método de
Amussat, signo de
Anel, operación de
Antyllus, método de
- B**
- p.7 **Babcock**, operación de
Bairnsdale, úlcera de
Ballance, signo de
Bancroft, signo de
Bannayan-Riley-Ruvalcaba,
síndrome de
Banti, enfermedad de
Barron, ligadura
Bayford-Autenrieth, disfagia de

- Beck**, cánula
Behcet, síndrome de
Bentall, operación de
Bernstein, maniobra de
Berry, aneurisma de
Bichat, conducto de
Bichat, membrana o túnica
Binswanger, enfermedad de
Boerema-Crile, operación de
Botal, ductus arteriosus de
Boyd, vena comunicante de
Bozzolo, signo de
Branham, signo de
Breschet, vena de
Brodie-Trendelenburg, test de
Brodie-Trendelenburg, test de
percusión
Budd-Chiari
Buerger, enfermedad de

C

- p.12 **Cauchois-Eppinger-Frugoni**,
síndrome de
Carrell, técnica de

- Charcot**, síndrome I de
Charcot-Bouchard, aneurisma de
Charcot-Weiss-Baker, síndrome de
Charles, operación de
Churg-Strauss, enfermedad de
Cloquet, ganglio de
Cobb, síndrome de
Cockett, operación de
Cockett, síndrome de
Cockett, venas perforantes de
Corrigan, pulso de
Crawford, técnica de
Crawford, clasificación de
Crile, pinza de
Cruveilhier-Baumgarten,
enfermedad de

D

- p.15 **David**, técnica de
De Bakey, clasificación de
De Bakey, clamp de
Dieulafoy, ulceración de

Dodd, vena comunicante de
Döhle-Heller, síndrome de
Doppler, ecografía
Doppler, ultrasonografía
Ducuing, signo de
Duroziez, signo de

E

p.17 **Ehlers-Danlos**, síndrome de
Eustaquio, válvula de
Esmarch, banda, torniquete o
venda elástica
Esmarch, hemostasia de

F

p.17 **Fahreus-Linqvist**, efecto
Ferguson, técnica de
Fogarty, sonda de
Fontaine, clasificación de
Fraley, signo de

G

p.18 **Galeno**, vena de
Greenfield, filtro de

Giacomini, vena de
Gorham, enfermedad de
Gott, tubo heparinizado de
Gougerot-Ruiter, síndrome de
Gsell-Erdheim, síndrome de
Gull-Sutton, síndrome de

H

p.20 **Hach**, clasificación de
Halsted, pinza de
Hampton, joroba de
Haven, síndrome de
Havers, canales de
Heubner, arteria de
Heubner, enfermedad de
Hesselbach, triángulo de
Homans, operación de
Homans, signo de
Horton, enfermedad de
Hunter, vena comunicante de
Huchard, enfermedad de
Hughes, síndrome de

K

p.22 **Kawasaki**, enfermedad de
Kaposi, sarcoma de
Kassabach-Meritt, síndrome de
Kelly, pinza de
Kehr, signo de
Kimray-Greenfield, filtro de
Kirschner-Perthes, método de
Klippel-Trenaunay, síndrome de
Kocher, incisión de
Kocher, maniobra de
Kocher, pinzas de
Korotkov, test de
Kussmaul, signo de
Kussmaul-Maier, enfermedad de

L

p.25 **Lejars**, suela venosa de
Leriche, operación de
Leriche, síndrome de
Leonardo, arco de

Liebow-Carrington, síndrome de
Linton, técnica de
Lowenberg, signo de
Lower, tubérculo de

M

p.26 *Maffucci, síndrome de*
Marfan, enfermedad de
Martorell, úlcera de
Martorell, signo de
Martorell, síndrome de
Martorell, prueba flebográfica de
Massell y Ettinger, prueba de
May-Thurner, síndrome de
Masson, órgano de
Meige, Enfermedad de
Miles, clip de
Milligan-Morgan, técnica de
Milroy, enfermedad de
Mitchell, enfermedad de
Mönckeberg, esclerosis de
Mondor, enfermedad de

Moretz, clip de
Moschowitz, enfermedad de
Müller, signo de
Musset, signo de

N

p.30 *Naffziger, prueba de*
Noonan, síndrome de
Nygaard-Brown, síndrome de

O

p.31 *Oliver-Cardarelli, signo de*
Olow, signo de
Oschner-Mahorner, prueba de

P

p.31 *Pachón, oscilómetro de*
Paget-Schroëtter, síndrome de
Pean, pinza de
Pemberton, signo de
Perthes, prueba de
Peyer, placas de
Pratt, prueba de
Proteus, síndrome de

Q

p.33 *Quincke, pulso capilar de*

R

p.33 *Rasmussen, aneurisma de*
Ratschow, prueba postural de
Raynaud, enfermedad de
Raynaud, fenómeno de
Render-Osler, angiomatosis telangiectásica familiar de
Riolano, arco de
Riva-Rocci, esfigmomanómetro de

S

p.35 *Sack-Barabas, síndrome de*
Saegesser, signo de
Sappey, plexo de
Satinsky, pinza
Servelle-Martorell, síndrome de
Seldinger, técnica de
Schultze, acroparestesia de
Schwartz, maniobra de

Sherman, vena comunicante de

Sneddon, síndrome de

Solomon, síndrome de

Stanford, clasificación de

Stent

Stewart-Treves, síndrome de

Stuart, síndrome de

Sturge-Weber, enfermedad de

Swan-Ganz, catéter de

T

p.38 **Takayasu**, enfermedad de

Thompson, operación de

Tolosa Hunt, síndrome de

Traube, signo de

Trendelenburg, operación de

Trendelenburg, posición de

Trendelenburg, test de

Trousseau, síndrome de

Turner, síndrome de

V

p.40 **Vierordt**, aparato de

Virchow, ganglio de

Virchow, tríada de

Virchow-Robin, espacios de

Vieussens, anillo oval de

Vieussens, asa de

Volkman, canales de

Volkman, contractura isquémica de

Von Hippel-Lindau, síndrome de

W

p.42 **Waldeyer**, anillo de

Warren, intervención de

Weber, flebectasia de

Wegener, granulomatosis de

Westermark, signo de

Williams, síndrome de

Willis, polígono de

Wyburn-Masson, síndrome de

Z

p.43 **Zuckerkandl**, órgano de

A

Adamkiewicz,

arteria de Es la más larga de las arterias medulares que nutre la médula espinal. Nace habitualmente entre la 9ª y 12ª vértebras dorsales. Su lesión puede producir una isquemia medular (de importancia en las intervenciones para la reparación de aneurismas de aorta) con secuelas neurológicas.

Adams-DeWeese,

clip de Método de interrupción parcial del flujo de sangre en la vena cava inferior para reducir el éstasis que ocasiona la ligadura, o para prevenir la migración de trombos desde extremidades inferiores. Actualmente se utilizan filtros endoluminales.

Adson,

maniobra de Descarta la compresión de la arteria subclavia por el músculo escaleno o la presencia de costilla cervical. Se hace girar el mentón del paciente hacia el lado afecto al tiempo que se hace una hiperextensión e inspiración forzada. Es positiva si desaparece el pulso distal, existe un descenso de la presión arterial de 15 mmHg o aparecen soplos que antes no existían.

Adson-Caffey,

síndrome Síndrome de la costilla cervical o de compresión neurocirculatoria del escaleno anterior, que se manifiesta por una compresión de la arteria subclavia y del plexo braquial a nivel del área costoclavicular o entre la clavícula y la primera costilla. También se conoce como **síndrome de Naffziger**.

Allen,
maniobra de Descarta la compresión de la arteria subclavia por el músculo escaleno o la presencia de costilla cervical. Colocación de ambas manos sobre la cabeza llevando ambos codos hacia atrás sin levantar los hombros. Es positiva si desaparece el pulso distal, existe un descenso de la presión arterial de 15 mmHg o aparecen soplos que antes no existían.

Allen,
test de Permite valorar la permeabilidad de la arteria radial y el arco palmar. Para ello se comprime fuertemente la arteria radial al tiempo que el paciente cierra fuertemente la palma de la mano. Al abrirla, la coloración está disminuida, recuperándose en pocos segundos en condiciones normales, mientras que si existe oclusión cubital o palmar permanece intensamente pálida hasta descomprimir la radial.

Allen y Brown,
criterios de Criterios diagnósticos del fenómeno de Raynaud:
Ataques intermitentes de decoloración isquémica de las extremidades.
Ausencia de oclusiones arteriales orgánicas.
Distribución bilateral.
Los cambios tróficos, en caso de estar presentes, se limitan a la piel y en ningún caso consisten en gangrena.
Ausencia de otras condiciones o enfermedades sistémicas que puedan desencadenar el fenómeno de Raynaud.
Duración de más de dos años.

Allis,
pinza de Pinza de hemostasia cuyas ramas terminan en dientes. Utilizadas para hemostasia de vasos sanguíneos y para sujetar tejidos.

Amussat,
método de Método para reducir las hemorragias arteriales.

Amussat,

signo de Signo utilizado en medicina forense para designar el desgarro de la túnica interna de la carótida primitiva producido tras el ahorcamiento.

Anel,

operación de Procedimiento empleado en el tratamiento del aneurisma que consiste en la ligadura de una arteria inmediatamente por encima del mismo.

Antyllus,

método de Técnica quirúrgica que fue la base para el tratamiento del aneurisma aórtico ya descrito por Antyllus (125 a. de C). Consiste en la aplicación de dos ligaduras, proximal y distal al aneurisma, y apertura del mismo.

B

Babcock,

operación de Método de tratamiento de las venas varicosas mediante extirpación de la safena tras canalización de la misma mediante una sonda y ligadura posterior de la venas comunicantes. También llamada **Stripping**.

Bairnsdale,

úlceras de Úlcera que aparece habitualmente en extremidades inferiores con lesión tisular y de pequeños vasos producida por *Mycobacterium ulcerans*.

Ballance,

signo de Matidez cambiante en flanco derecho y matidez fija en flanco izquierdo que indica gran cantidad de sangre libre junto con un gran hematoma periesplénico. Debe descartarse la rotura esplénica.

Bancroft,

signo de Dolor a la palpación de la musculatura de la pantorrilla contra la estructura ósea en la trombosis venosa profunda.

Bannayan

-Riley

-Ruvalcaba,

síndrome de Enfermedad autosómica dominante que asocia macrocefalia, lipomas, poliposis intestinal, tiroiditis de Hashimoto y malformaciones arteriovenosas y linfáticas.

Banti,

enfermedad de Síndrome que asocia anemia, esplenomegalia congestiva, trombocitopenia, leucopenia, hemorragias gastrointestinales, obstrucción de las venas esplénica, porta e intrahepáticas con posterior cirrosis hepática. Secundaria a hipertensión portal.

Barron,

ligadura de Técnica de ligadura de hemorroides internas con bandas elásticas.

Bayford

-Autenrieth,

disfagia de Llamada también disfagia lusoria, que se produce por la compresión del esófago por una anomalía de la arteria subclavia derecha, que nace de la aorta descendente y pasa entre el esófago y la columna vertebral.

Beck,

cánula Cánula del tipo “mariposa” utilizada para las transfusiones sanguíneas.

Behcet,

síndrome de Enfermedad crónica inflamatoria de etiología desconocida que cursa con ulceración mucocutánea con formación de úlceras bucales y genitales, afectación ocular con uveítis e hipopion y afectación articular. Puede

aparecer una vasculitis sistémica con formación de aneurismas o trombosis en riñón, pulmón o cerebro.

Bentall,
operación de Técnica quirúrgica del aneurisma disecante de la aorta cuando se afecta la raíz aórtica donde se sustituye la aorta ascendente por un tubo de Dacron valvulado al que se reimplanta las arterias coronarias.

Bernstein,
maniobra de Aplicación de un torniquete en la raíz del muslo para valorar la insuficiencia troncular pura o de comunicantes perforantes, según rellene el territorio venoso al pasar el paciente de decúbito a bipedestación o mediante la deambulación.

Berry,
aneurisma de Aneurisma localizado en el polígono de Willis, causa común de hemorragia subaracnoidea.

Bichat,
conducto de Pasaje situado debajo del aracnoides para la **vena de Galeno**.

Bichat,
membrana o túnica Hace referencia a la túnica íntima de los vasos.

Binswanger,
enfermedad de Enfermedad neurológica caracterizada por la degeneración de la materia blanca del cerebro. Inicio en la sexta o séptima década de la vida asociada a deterioro cognitivo y motor, alteraciones conductuales, crisis convulsivas y accidentes cerebrovasculares. Relacionada con la hipertensión arterial y resto de factores de riesgo cardiovascular. Probable origen en la arterioesclerosis vascular cerebral.

Boerema-Crile,
operación de Tratamiento quirúrgico para el san-

grado agudo por varices esofágicas en hipertensión portal. Esofagotomía transtorácica y ligadura de varices.

Botal,
ductus arteriosus

de Vaso fetal que comunica la arteria pulmonar izquierda con la aorta descendente. Esta comunicación se cierra tras el nacimiento.

Boyd,
vena

comunicante de Vena perforante que comunica la vena safena interna con la vena tibial posterior.

Bozzolo,

signo de Pulsación de los vasos de la mucosa nasal que puede aparecer en presencia de un aneurisma de la aorta torácica.

Branham,

signo de La presión cutánea con un dedo sobre

una fistula arteriovenosa ocluyéndola, aumenta la resistencia periférica produciendo bradicardia refleja cuando existe una circulación significativa por la fistula. También llamado **signo de Nicoladoni-Israel-Branham**.

Breschet,

vena de Una de las venas del diploe de los huesos craneales conectada por venas emisarias con el seno venoso cerebral (las principales venas diploicas son la frontal, la temporal anterior y temporal posterior, y la occipital).

Brodie

-Trendelemburg,

test de Test para venas varicosas que explora la normalidad de la válvula situada en la desembocadura de la safena interna en la vena femoral. Con el paciente en decúbito supino se eleva la pierna varicosa hasta la desaparición de las varices. Posteriormente se coloca una

ligadura elástica en el muslo ocluyendo la vena safena. Tras el paso a bipedestación las venas comienzan a llenarse desde su parte más distal por el retorno sanguíneo normal. Si al retirar la ligadura (tras 60 segundos) se produce un llenado instantáneo de las varices se considera el origen del trastorno en la válvula safeno-femoral. También llamado **test de Trendelenburg-Brodie**.

Brodie
-Trendelenburg,
test de percusión

Test para valorar la competencia valvular de las venas superficiales en las extremidades inferiores. Con una mano sobre el extremo distal de la vena a explorar. Se realiza percusión en su parte proximal. La detección de la onda en la parte distal tras la percusión denota incompetencia de las válvulas venosas.

Budd-Chiari
enfermedad de

Enfermedad infrecuente, caracterizada por la obstrucción de las venas suprahepáticas o de la cava inferior. Entre las causas conocidas, la más frecuente es la trombosis de las venas suprahepáticas por síndromes de hipercoagulabilidad, post-radiación y por uso de determinados fármacos como los anticonceptivos, aunque también puede ser consecuencia de invasión de la vena cava por tumores generalmente hepáticos y renales. Es más frecuente en mujeres.

Buerger,
enfermedad de

Enfermedad inflamatoria de la pared vascular que evoluciona a brotes y lesiona segmentos arteriales y venosos de pequeño calibre. Afecta preferentemente a varones jóvenes y se localiza en las extremidades inferiores con aparición de isquemia. También llamada **tromboangeítis obliterante**.

C

Cauchois

-Eppinger

-Frugoni,

síndrome de Inflamación y trombosis crónica y recidivante de la vena porta y probablemente de la vena esplénica que causa esplenomegalia o hepatoesplenomegalia, anemia, leucopenia y trombopenia. Pueden existir signos de hipertensión portal.

Carrell,

técnica de Técnica de anastomosis termino-terminal de los vasos sanguíneos que sirvió de base para futuros procedimientos en cirugía cardiovascular y la realización de trasplantes.

Charcot,

síndrome I de Obliteración vascular que reduce la circulación en la musculatura de las

extremidades inferiores. Cursa con dolor, calambres y debilidad en las piernas en relación al esfuerzo. Puede aparecer en patologías como la **enfermedad de Buerger**. Conocido como claudicación intermitente.

Charcot

-Bouchard,

aneurisma de Microaneurisma de los pequeños vasos cerebrales que puede ocasionar hemorragias intracraneales.

Charcot-Weiss

-Baker,

síndrome de Aparición de síncope transitorios y disminución de la presión arterial y frecuencia cardíaca en relación a la estimulación de los baroreceptores del seno carotídeo. Los episodios, que en ocasiones pueden estar precedidos o acompañados de síntomas neurológicos, aparecen con los giros bruscos de la cabeza o al ejercer presión sobre

el cuello. Llamado también síndrome de hipersensibilidad del seno carotídeo.

Charles,
operación de Técnica quirúrgica del linfedema crónico. Anastomosis de los colectores linfáticos profundos con los linfáticos superficiales.

Churg-Strauss,
enfermedad de Tipo poco frecuente de vasculitis asociada a rinitis alérgica, poliposis nasal y asma. Existe una afectación sistémica de las arterias y venas de pequeño y mediano tamaño por inflamación granulomatosa.

Cloquet,
ganglio de Ganglio linfático crural localizado adyacente o en el canal femoral. Puede aumentar su tamaño en contexto de patologías del miembro inferior o de vecindad.

Cobb,
síndrome de También llamado angiomatosis cutáneo-meníngeo-espinal. Síndrome caracterizado por presentar una malformación capilar de distribución metamérica en tronco o extremidades, y una malformación vascular de la médula espinal.

Cockett,
operación de Técnica quirúrgica para el tratamiento de las perforantes insuficientes.

Cockett,
síndrome de Trombosis venosa por compresión de la vena ilíaca izquierda primitiva por un estrechamiento de la misma al paso entre la arteria ilíaca izquierda y la columna lumbar. Puede ocurrir como consecuencia de un **síndrome congénito de May-Thurner**.

Cockett,

venas

perforantes de Tres venas ubicadas en el tercio inferior de la cara interna de la pierna. Desembocan en el tronco tibial posterior y están unidas por el arco anastomótico de Leonardo. A 6 cm por arriba del maléolo interno la vena perforante Cocket I, a 12 cm la Cocket II y a 18 cm la Cocket III.

Corrigan,

pulso de Pulsaciones carotídeas o temporales visibles en la insuficiencia aórtica.

Crawford,

técnica de Técnica de reconstrucción anatómica del aneurisma de aorta toracoabdominal.

Crawford,

clasificación de Clasificación de los aneurismas de aorta toracoabdominal:
Tipo I. Desde el tercio superior de la

aorta torácica hasta la parte superior de la abdominal. Incluye arterias viscerales.

Tipo II. Desde el tercio proximal de la aorta descendente a la aorta infrarrenal.

Tipo III. Empieza en los dos tercios distales de la aorta torácica y se extiende por gran parte de la aorta abdominal.

Tipo IV. Confinado a la aorta abdominal, incluyendo vasos viscerales.

Crile,

pinza de Pinza hemostática con o sin dientes. Se utiliza para el clamp de vasos sanguíneos. Es parecida a la de Kelly, la diferencia es que presenta un tramo de ranuras más largo.

**Cruveilhier
-Baumgarten,
enfermedad de**

Cirrosis hepática causada por la persistencia de la vena umbilical que

comunica con la vena porta causando una circulación colateral. Se asocia a venas periumbilicales prominentes, hipertensión portal, atrofia hepática y esplenomegalia. Puede aparecer por persistencia de la vena umbilical en el nacimiento (**enfermedad de Cruveilhier-Baumgarten**) o de forma adquirida por reapertura de dicha vena con una hipertensión portal (**síndrome de Cruveilhier-Baumgarten**).

D

David,
técnica de Técnica quirúrgica del aneurisma disecante de la aorta cuando se afecta la raíz aórtica donde se realiza una plicatura del anillo valvular aórtico evitando la sustitución valvular.

De Bakey,
clasificación de Clasificación de las disecciones aórti-

cas que se basa en la localización anatómica y en la extensión de las mismas:

Tipo I. La disección afecta a la aorta ascendente, cayado aórtico y aorta descendente.

Tipo II. La disección afecta sólo a la aorta ascendente.

Tipo III. La disección afecta sólo a la aorta torácica en el tipo IIIa y a la aorta abdominal e ilíacas en el tipo IIIb.

De Bakey,
clamp de Clamp vascular utilizado en la cirugía del aneurisma aórtico.

Dieulafoy,
ulceración de Anormalidad vascular en el estómago proximal, en el que una arteria submucosa causa erosión del epitelio de la mucosa gástrica pudiendo producirse una trombosis o rotura de la misma con la consecuente hemorragia.

Dodd,
vena

comunicante de Vena comunicante en el tercio inferior del muslo, a nivel del canal de Hunter, tributaria de la vena femoral superficial.

Döhle-Heller,

síndrome de Manifestación común de la sífilis terciaria. Aortitis secundaria a sífilis que puede complicarse con insuficiencia valvular aórtica, estenosis coronaria y aneurismas de aorta. Es más frecuente en varones y muy prevalente en sífilis no tratadas. También llamado mesoaortitis de Heller-Döhle.

Doppler,
ecografía

La combinación de la ecografía bidimensional y el Doppler pulsado permite observar la morfología del vaso explorado y las características de su pared, al punto que puede medir la velocidad de la sangre en el punto deseado.

Doppler,

ultrasonografía Valoración de la velocidad y sentido del flujo sanguíneo mediante la medida de la variación de frecuencia de un haz de ultrasonidos al chocar con un cuerpo en movimiento (hematíes). El análisis de la onda permite valorar el grado de estenosis vascular.

Ducuing,

signo de Dolor a la movilización muscular de la pantorrilla en la trombosis venosa profunda.

Duroziez,

signo de Soplo vascular sistólico y diastólico que se percibe en la arteria femoral en la insuficiencia valvular aórtica. Llamado también **soplo crural de Duroziez**.

E

Ehlers-Danlos,

síndrome de Enfermedad con herencia dominante que se caracteriza por alteraciones en el colágeno tipo I y III. Asocia hiperlaxitud articular, hiperelasticidad cutánea, alteraciones esqueléticas y fragilidad capilar. El tipo IV (forma vascular) o **síndrome de Sack-Barabas**, cursa con la rotura de grandes arterias (aorta).

Eustaquio,

válvula de Válvula de la vena cava inferior. Repliegue membranoso semilunar en la aurícula derecha entre el margen anteroinferior de la vena cava inferior y la fosa oval.

Esmarch,

banda,
torniquete o
venda elástica Tipo de venda elástica más ancha y

larga que sirve en el preoperatorio para vaciar las extremidades de sangre venosa arterial y linfa como medida de hemostasia antes de iniciar la intervención.

Esmarch,

hemostasia de Utilización de la banda o **venda de Esmarch** para realizar en el preoperatorio una evacuación de la sangre y linfa en extremidades inferiores. Se inicia el vendaje en la parte más distal de la extremidad y se completa hacia la zona proximal donde se aplica un torniquete. Posteriormente se inicia la retirada desde su parte más distal.

F

Fahreus

-Linqvist,

efecto Descenso de la viscosidad de la sangre que ocurre cuando fluye por vasos

de diámetro inferior a 1.5 mm y se debe a que en la microcirculación el hematocrito es más bajo que en los grandes vasos y al alineamiento de los eritrocitos.

Ferguson,

técnica de Técnica de hemorroidectomía cerrada en la que tras la resección de los principales paquetes hemorroidales, la herida quirúrgica se cierra con sutura pudiendo en algunos casos abrirse espontáneamente.

Fogarty,

sonda de Catéter provisto de un balón empleado en la embolectomía arterial en casos de oclusión arterial aguda.

Fontaine,

clasificación de Método de clasificación de la aterosclerosis obliterante, que divide la enfermedad en cuatro estadios evolutivos:

Estadio I. Asintomático o síntomas inespecíficos.

Estadio II. Claudicación intermitente.

Estadio III. Dolor en reposo.

Estadio IV. Lesiones isquémicas.

Fraley,

signo de Obstrucción del cáliz superior renal por el cruce a nivel infundibular de una estructura vascular.

G

Galeno,

vena de Gran vena formada por la unión de las dos venas cerebrales profundas y por la vena basal posterior de Rosenthal, en la parte caudal de la tela corioides del tercer ventrículo, pasa caudalmente al cuerpo calloso y se curva dorsalmente para continuar hasta su drenaje en el seno recto.

Greenfield,

filtro de Filtro de vena cava inferior para prevención de embolismos pulmonares en contexto de enfermedad tromboembólica venosa y contraindicación para la anticoagulación.

Giacomini,

vena de O vena femoropoplítea, es una vena de unión de la vena safena externa proximal con la vena safena interna proximal. Ante una oclusión trombótica de la vena poplítea y de la vena femoral posibilita el drenaje del territorio de la vena safena externa a la vena safena interna.

Gorham,

enfermedad de Enfermedad congénita que asocia malformaciones venosas y linfáticas cutáneas, mediastínicas y óseas. Afecta por igual a ambos sexos.

Gott,

tubo

heparinizado de Prótesis utilizada en la reparación de la disección del aneurisma aórtico abdominal que conecta el cayado aórtico y la aorta distal, asegurando el riego distal y eliminando el peligro de isquemia medular.

Gougerot

-Ruiter,

síndrome de Vasculitis alérgica de la piel que se caracteriza por la aparición de eritema, vesículas, pústulas, edema exudativo, telangiectasias, arteriolitis de los vasos cutáneos y hemorragia cutánea. Puede aparecer fiebre, artralgias y síntomas gastrointestinales. También llamado **enfermedad de Ruiter**.

Gsell-Erdheim,

síndrome de Síndrome de herencia autosómica dominante que cursa con la necrosis idiopática de la lámina media de la

aorta con la consecuente formación de quistes no inflamatorios que pueden provocar la rotura aórtica. Causa frecuente de disección de aorta.

Gull-Sutton,
síndrome de Fibrosis arteriocapilar del riñón.

H

Hach,
clasificación de División las varices superficiales (troncales) de la vena safena interna en cuatro grados y las várices superficiales (troncales) de la vena safena externa en tres grados.

Halsted,
pinza de Pinza quirúrgica para realizar hemostasia (Halsted-mosquito).

Hampton,
joroba de Imagen radiológica de condensación

con morfología triangular con su vértice apuntando hacia el hilio, que suele corresponderse a un infarto pulmonar en el tromboembolismo.

Haven,
síndrome de Síndrome de compresión de la arteria subclavia por el músculo escaleno que asocia dolor en la extremidad superior iniciado en el hombro y con progresión hacia la mano. Pérdida del pulso radial.

Havers,
canales de Canales en el hueso compacto formados por láminas óseas concéntricas. Contienen vasos sanguíneos, nervios y linfáticos y se extienden a lo largo de la diáfisis de los huesos largos.

Heubner,
arteria de La **arteria recurrente de Heubner** es una rama profunda procedente de la arteria cerebral anterior, utilizando

el espacio perforado anterior proporciona irrigación a una parte de la cápsula interna y de los núcleos basales.

Heubner,
enfermedad de Endarteritis obliterante de las arterias cerebrales en la fase tardía o terciaria de la sífilis. En la lesión vascular se produce una proliferación subintimal fibrótica que estrecha la luz y una reacción inflamatoria de la adventicia.

Hesselbach,
triángulo de Espacio anatómico de interés en cirugía. Limitado en su margen medial por la fascia del músculo recto abdominal; en su margen inferior y lateral, el ligamento inguinal; y en el superior, los vasos epigástricos inferiores.

Homans,
operación de Ligadura de la vena femoral como profilaxis contra el embolismo en flebotrombosis de extremidad inferior.

Homans,
signo de Con la rodilla en flexión de 30 grados se realiza una flexión anterior (dorsiflexión) del pie. La aparición de dolor en la pantorrilla es sugestiva de trombosis venosa profunda.

Horton,
enfermedad de Es la llamada arteritis de la temporal. Forma de arteritis de las células gigantes. Vasculitis granulomatosa sistémica que puede localizarse en la aorta, riñones, corazón, extremidades, subclavia, mesentéricas, y como una localización frecuente, en la arteria temporal. Puede afectar a la arteria del nervio óptico, y causar ceguera. No se conoce su causa. Se presenta predominantemente en mujeres de edad avanzada y cursa con cefalea, anemia y elevación de la VSG.

Hunter,
vena comunicante de Vena perforante que une las venas superficiales con las venas profundas.

Huchard,
enfermedad de Hipertensión arterial en relación a arteriosclerosis.

Hughes,
síndrome de También llamado síndrome antifosfolípido. Síndrome protrombótico autoinmune que se caracteriza por la asociación de niveles moderados o altos de anticuerpos antifosfolípido junto con trombosis, tanto arteriales como venosas, pérdidas fetales de repetición y/o trombopenia.

K

Kawasaki,
enfermedad de También llamada síndrome linfomu-

cocutáneo. Asocia conjuntivitis, exantema cutáneo con edema y descamación palmoplantar, adenopatías laterocervicales generalmente unilaterales y enantema en orofaringe. Puede presentar aneurisma coronario por inflamación de la pared vascular.

Kaposi,
sarcoma de Tumor vascular maligno detectado principalmente en varones adultos, que se presenta en su forma clásica como múltiples manchas de color púrpura o parda en regiones distales de extremidades inferiores.

Kassabach
-Meritt,
síndrome de Síndrome que asocia hemangiomas cavernosos gigantes con coagulopatía de consumo y trombocitopenia.

Kelly,
pinza de Pinza hemostática con ranuras en sus

dos ramas. Presenta un sistema de cremallera para dejarla fija una vez pinzado el vaso. Pueden ser rectas o curvas.

Kehr,
signo de Dolor irradiado a hombro izquierdo en la rotura esplénica.

Kimray
-Greenfield,
filtro de Dispositivo de colocación percutánea que impide la migración de grandes trombos desde las extremidades inferiores. Utilizado en el tromboembolismo pulmonar cuando existe contraindicación para la anticoagulación en presencia de trombosis venosa profunda persistente.

Kirschner
-Perthes,
método de Colocación en la extremidad inferior de un manguito neumático que la

envuelve y comprime obteniéndose un vaciado artificial de los vasos de la pierna.

Klippel
-Trenaunay,
síndrome de Síndrome de etiología desconocida, en el que se observan malformaciones capilares, venosas o linfáticas. Es frecuente encontrar una displasia capilar en una extremidad, hipertrofia ósea y de tejidos blandos sobretudo en la adolescencia y presencia de venas varicosas con agenesia valvular que aunque pueden aparecer en el nacimiento, son más frecuentes con el inicio de la deambulación. Es frecuente la aparición de tromboflebitis, celulitis y linfedema progresivo. También llamado **síndrome de Parkes Weber**.

Kocher,
incisión de Llamamos incisión de Kocher a la subcostal, que en el lado derecho

expone la vesícula biliar y la vía biliar común, y en el lado izquierdo da acceso a la esplenectomía o a la anastomosis venosa esplenorrenal.

Kocher,
maniobra de Movilización operatoria del duodeno para facilitar el acceso al conducto biliar común y a los grandes vasos retroperitoneales en cirugía abdominal.

Kocher,
pinzas de Pinzas vasculares para realizar hemostasia arterial cuyas ramas terminan en un diente que encaja en una muesca situada en el extremo de la otra. También utilizadas en cirugía abdominal y pélvica para sujetar tejidos.

Korotkov,
test de En un aneurisma, si la presión arterial en los vasos periféricos se mantiene mientras se realiza una compresión de la arteria por encima del aneurisma, traduce una buena circulación colateral.

Kussmaul,
signo de Aparición de nódulos subcutáneos que siguen el trayecto vascular en la poliarteritis nudosa.

Kussmaul
-Maier,
enfermedad de O periarteritis nudosa. Enfermedad vascular que afecta a las arterias de pequeño y mediano calibre. Puede afectar a cualquier órgano y se caracteriza por nódulos palpables en las trayectorias de los vasos. Los síntomas son muy numerosos e incluyen fiebre, dolor muscular, taquicardia, pérdida de peso, polineuritis, infarto de miocardio, convulsiones y alteraciones de la visión. No se conoce su etiología, pudiendo ser una reacción de hipersensibilidad. Es más frecuente en los hombres.

L

Lejars,

suela venosa de Red venosa plantar (venas metatarsianas, arcadas y marginales de la planta del pie) que drena hacia el dorso del pie donde su unión con otras venas contribuye a la formación del sistema safeno. Su compresión durante la marcha facilita el retorno venoso.

Leriche,

operación de Denudación quirúrgica de la vaina adventicia vascular que contiene las fibras nerviosas simpáticas con objeto de corregir diversos trastornos vasomotores. También se denomina simpatectomía periarterial.

Leriche,

síndrome de Obliteración de la bifurcación aórtica y de las arterias ilíacas. Cursa con claudicación intermitente, impotencia sexual y ausencia de pulso en ambas

arterias femorales. Más adelante pueden aparecer lesiones isquémicas en forma de úlceras o necrosis. También llamado síndrome de obliteración aortoiliaca.

Leonardo,

arco de Vena que se une a la safena interna en el tercio superior de la pierna que constituye un arco venoso posterior al que drenan las venas comunicantes.

Liebow

-Carrington,

síndrome de Variante linfoide de la **enfermedad de Wegener**. Cursa con los mismos síntomas excepto la afectación renal.

Linton,

técnica de Técnica quirúrgica para el tratamiento de las varices mediante la ligadura de las venas perforantes.

Lowenberg,

signo de Dolor distal a la insuflación del manguito

to del esfigmomanómetro en el contexto de una trombosis venosa profunda.

Lower,
tubérculo de Relieve transversal entre la vena cava inferior y la vena cava superior situado en la cara posterior de la aurícula derecha.

M

Maffucci,
síndrome de Síndrome en el que coexisten anomalías linfáticas y venosas asociadas a exostosis y encondromas. Las lesiones óseas aparecen en los primeros años de vida y posteriormente las lesiones vasculares. Aparecen hemangiomas cutáneos como consecuencia de ectasias y tumores vasculares o acúmulo anormal de pigmento melánico en la dermis.

Marfan,
enfermedad de Afección del tejido conectivo que se hereda de forma dominante y que afecta fundamentalmente a los ojos, aparato locomotor y sistema cardiovascular. Aparece dilatación aórtica como consecuencia de la degeneración quística de la capa media.

Martorell,
úlceras de Úlcera que aparece en las extremidades inferiores de pacientes hipertensos. La arterioesclerosis origina isquemia cutánea. La aparición de úlceras es habitualmente bilateral y presentan evolución tórpida. Son más frecuentes en mujeres. También llamada **síndrome de Martorell**.

Martorell,
signo de 1. Signo arteriográfico típico de la tromboangeítis obliterante que consiste en la presencia de obliteraciones segmentarias y una red de arteriolas

de circulación colateral.

2. Dolor lancinante en la pierna por hemorragia venosa intramuscular, seguida de equimosis y signos de trombosis y espasmo arterial.

Martorell,
síndrome de Enfermedad inflamatoria de la aorta de probable origen autoinmune que cursa con la obliteración de uno o más troncos supraaórticos. La oclusión reduce el flujo sanguíneo en las áreas que irrigan dichos troncos. Puede aparecer marcadas estenosis arteriales con desaparición de pulsos carotídeo o de extremidades. Las estenosis carotídeas pueden producir fenómenos isquémicos cerebrales y oculares con síntomas neurológicos como afasia, hemiparesia transitoria, amaurosis, cefaleas, vértigo, etc. Pueden aparecer trombosis, afectación coronaria, aneurismas o estenosis de la arteria renal con hipertensión. Es más frecuente en mujeres jóvenes,

siendo su evolución progresiva. También llamado **síndrome de Martorell-Fabré** o de **Takayasu-Martorell**.

Martorell,
prueba
flebográfica de Aplicación de la flebografía al tratamiento quirúrgico de las varices.

Massell y
Ettinger,
prueba de Flebografía con ligaduras escalonadas. Se colocan ligaduras a tres niveles: supramaleolar, supracondíleo y en la raíz del muslo. Se inyecta contraste en una vena del dorso del pie, impresionándose en las películas radiográficas en forma sucesiva. El paso de contraste del sistema profundo al superficial traduce la existencia de perforantes incompetentes.

May-Thurner,
síndrome de Estrechamiento congénito de la vena

ilíaca izquierda cuando la arteria ilíaca pasa sobre ella. Puede cursar de forma asintomática o con episodios de edema, flebitis y trombosis venosa profunda en la extremidad en función de la compresión que ejerce la arteria por su situación anatómica.

Masson,
órgano de Estructura vascular nodular con anastomosis arteriovenosas en la hipodermis, localizada en particular en la terminación de las arterias de las manos y pies. Regula la perfusión de sangre de la piel y la pérdida de calor.

Meige,
enfermedad de Forma de linfedema hereditario o primario que se da entre los 10 y los 20 años. Enfermedad hereditaria del sistema linfático que se caracteriza por la dificultad del drenaje de los vasos linfáticos. Afecta fundamentalmente a los miembros inferiores.

Miles,
clip de Método de interrupción parcial del flujo de sangre en la vena cava inferior para reducir el éstasis que ocasiona la ligadura, o para prevenir la migración de trombos desde extremidades inferiores. Actualmente se utilizan filtros endoluminales.

Milligan
-Morgan,
técnica de Técnica de hemorroidectomía abierta en la que tras la ligadura y escisión de los principales paquetes hemorroidales, la herida quirúrgica permanece abierta y cicatriza lentamente desde el fondo a la superficie.

Milroy,
enfermedad de Es la forma congénita del linfedema hereditario o primario. Enfermedad hereditaria del sistema linfático que se caracteriza por la dificultad del drenaje de los vasos linfáticos. Afecta

fundamentalmente a los miembros inferiores con intensidad variable aunque su forma congénita al igual que la secundaria afecta también a los miembros superiores.

Mitchell,
enfermedad de Enfermedad de herencia autosómica dominante que se manifiesta por una dilatación paroxística de los vasos periféricos acompañado de parestesias, eritema en manos y pies, y sensación de dolor urente. El desencadenante es el calor y suele ceder el dolor tras la inmersión en agua fría. También llamada eritromelalgia primaria.

Mönckeberg,
esclerosis de Se caracteriza por la fibrosis y calcificación de la túnica media de las grandes arterias sin causar reducción de la luz vascular ni isquemia. Afecta sobretodo a los vasos de las extremidades.

Mondor,
enfermedad de Trombosis de la vena toracoepigástrica junto con reacción inflamatoria venosa y del tejido conectivo adyacente. Puede palparse un cordón arroariado y doloroso a nivel del cuadrante supero-externo de la mama. Desaparece espontáneamente.

Moretz,
clip de Método de interrupción parcial del flujo de sangre en la vena cava inferior para prevenir la migración de trombos desde extremidades inferiores. Actualmente se utilizan filtros endoluminales.

Moschowitz,
enfermedad de Síndrome congénito caracterizado por púrpura trombocitopénica, anemia hemolítica, trombosis hialina de arteriolas y capilares, fallo renal y síntomas neurológicos. La embolia difusa y la trombosis de los pequeños

vasos cerebrales se manifiestan por afasia, ceguera y convulsiones. También llamada enfermedad de Baehr-Schiffirin.

Müller,
signo de Pulsación en la úvula que puede aparecer en la insuficiencia aórtica.

Musset,
signo de Movimiento de la cabeza sincrónico con el pulso arterial que puede aparecer en la insuficiencia aórtica.

N

Naffziger,
prueba de I. La presión sobre la vena yugular condiciona un aumento de presión del líquido cefalorraquídeo produciendo dolor en caso de un disco herniado.
II. La presión sobre el músculo escaleno en la base del cuello causa espas-

mos en la mano en caso de síndrome del escaleno.

Noonan,
síndrome de Enfermedad genética congénita similar fenotípicamente al síndrome de Turner, que asocia a la talla baja, cardiopatía, alteraciones faciales y torácicas, aplasia o hipoplasia de los vasos sanguíneos y linfáticos con aparición de linfedema.

Nygaard-Brown,
síndrome de Síndrome que cursa con obliteración arterial y reducción del tiempo de sangría (trombofilia). Su principal síntoma es la claudicación intermitente y en ocasiones la trombosis de vasos abdominales y pélvicos.

O

Oliver

-Cardarelli,

signo de Pulsación percibida en la laringe de forma sincrónica al latido cardiaco, indicativo de un aneurisma en el arco aórtico, masas mediastínicas o enfermedades obstructivas crónicas de la vía aérea. Se valora en bipedestación tomando el cartílago cricoides de la laringe entre los dedos índice y pulgar. También llamado **signo de Oliver**.

Olow,

signo de Dolor a la presión de las masas musculares de la pantorrilla en el contexto de una trombosis venosa profunda.

Oschner

-Mahorner,

prueba de Modificación del test de Perthes para la valoración de la competencia del

sistema venoso profundo. Tras la ligadura elástica en la rodilla y en la pantorrilla se hace caminar al paciente que si no refiere dolor y las varices superficiales se colapsan traduce la competencia de las venas comunicantes y del sistema venoso profundo.

P

Pachón,

oscilómetro de Aparato para la medición de la presión arterial, precursor de los actuales. Ya valoraba las oscilaciones de la presión en el torrente sanguíneo que quedaban representadas por la amplitud de oscilación de una aguja en un índice graduado.

Paget

-Schroëtter,

síndrome de Trombosis primaria de la vena axilar o subclavia debido a la compresión de

éstas por las estructuras que conforman la salida del tórax (ligamento costo-coracoideo, músculo escaleno anterior, clavícula y primera costilla). La compresión y los traumatismos repetidos (repetición de movimientos con el brazo) sobre la vena axilar y subclavia en pacientes sanos provocan la aparición de trombosis.

Peau,
pinza de Pinza vascular terminada en forma de espátula para realizar hemostasia arterial. Similares a las de Kocher pero sin dientes. También se suele utilizar para realizar curas, etc.

Pemberton,
signo de La aparición de edema, cianosis facial e ingurgitación en las venas del cuello al levantar simultáneamente ambos brazos. Se describe originalmente en el bocio endotorácico por dificultad del retorno venoso pero

puede aparecer en la neoplasia de pulmón, linfomas, timomas, aneurismas aórticos, etc.

Perthes,
prueba de Sirve para valorar la competencia del sistema venoso profundo. Con el paciente en bipedestación se realiza una ligadura elástica supracondílea que ocluya la safena interna. Tras unos 5 minutos de deambulación se valora la persistencia de las varices y el dolor. Si las varices han desaparecido, significa que el sistema venoso profundo y las venas comunicantes están indemnes. También llamado test de Delbet-Mocquot.

Peyer,
placas de Agrupaciones de tejido linfóide no encapsulado que forman placas alargadas en las paredes del intestino delgado. Constituyen uno de los mecanismos de defensa inmunológico del

organismo. Forman parte del tejido mucoso linfoide asociado al intestino.

Pratt,
prueba de Tiene por objeto la localización de perforantes insuficientes previa a la cirugía. Se vacía el miembro inferior elevándolo y se aplica un vendaje elástico desde los dedos del pie en sentido proximal hasta la desembocadura de la safena interna donde se aplica una ligadura. Se retira la venda desde la raíz del muslo hacia abajo. Al quedar eliminado el reflujo venoso por el lazo, donde se observa que se llena un paquete varicoso, existe una comunicante insuficiente.

Proteus,
síndrome de Trastorno que cursa con malformaciones hamartomatosas congénitas, gigantismo en manos y pies, nevos pigmentados, macrocefalia y anomalías craneales.

Q

Quinke,
pulso capilar de Pulsación y cambios en la coloración de los lechos ungueales que puede aparecer en la insuficiencia aórtica.

R

Rasmussen,
aneurisma de Dilatación aneurismática por erosión de una rama de la arteria pulmonar cercana a una cavitación tuberculosa. Es debida a la ruptura de la media y la protrusión de la íntima en la cavidad. Puede existir ruptura de la íntima y hemorragia con la aparición de hemoptisis. Debe descartarse en pacientes con hemoptisis y patologías destructivas del parénquima pulmonar.

Ratschow,
prueba

postural de Prueba para la detección del compromiso de la vascularización arterial en extremidades inferiores. Con el paciente en decúbito se elevan las extremidades inferiores y se observa la aparición de palidez distal. Posteriormente, en sedestación se observan las alteraciones en la duración de la hipermia reactiva y la replección venosa.

Raynaud,
enfermedad de

Trastorno vasomotor de etiología desconocida que se caracteriza por una vasoconstricción arterial en la región distal de las extremidades que produce una decoloración de las manos (con mucha menor frecuencia en los pies) y que puede progresar y originar alteraciones atróficas por isquemia crónica. Se ha relacionado con la exposición al frío o al estrés, e incluso con el consumo de tabaco y no existe evidencia de

enfermedad oclusiva arterial u otra patología subyacente. Es más frecuente en mujeres y se observa relación con el envejecimiento.

Raynaud,
fenómeno de

Vasoconstricción arterial periférica localizada en manos y con menor frecuencia en pies, que aparece en respuesta a estímulos como el frío o el estrés, en el contexto de alguna enfermedad subyacente como esclerodermia, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndrome de la costilla cervical, etc. Su aparición sin la existencia de otra patología se conoce como **enfermedad de Raynaud**.

Rendu-Osler,
angiomatosis
telangiectásica
familiar de

Afección transmitida con herencia autosómica dominante que asocia telangiectasias cutáneas localizadas en

la lengua, labios, esclerótica, orejas, punta de los dedos y en el lecho ungueal, así como malformaciones vasculares arteriovenosas cutáneas, mucosas y viscerales (pulmones, hígado y cerebro). Presenta complicaciones hemorrágicas y derivadas de la afectación visceral.

Riolano,

arco de Red de anastomosis de arterias procedentes de la arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior en la vascularización del colon.

Riva-Rocci,

esfigmomanómetro de Esfigmomanómetro de mercurio que se fundamenta en el principio de Vierordt, que mide en forma manométrica la fuerza necesaria para impedir la progresión de la onda del pulso. Basado en el **esfigmomanómetro de von Basch**. Posteriormente Korotkov estableció el método auscultatorio.

S

Sack-Barabas,

síndrome de Síndrome de herencia autosómica dominante, aunque existen casos no familiares, que cursa con aumento de la fragilidad capilar, siendo común la rotura de arterias. La hiperlaxitud articular e hiperelasticidad cutánea no son tan importantes. Existe un defecto en el colágeno tipo III. También llamada **forma vascular del síndrome de Ehlers Danlos**.

Saegesser,

signo de Dolor cervical por irritación frénica en la rotura esplénica.

Sappey,

plexo de O cabeza de medusa. Plexo de vasos linfáticos subdérmicos situado en la areola mamaria.

Satinsky,

pinza Pinza vascular de oclusión parcial. Permite la oclusión de grandes vasos para realizar hemostasia.

Servelle

-Martorell,

síndrome de Síndrome que cursa con malformaciones vasculares y esqueléticas. En el sistema venoso profundo se identifica hipoplasia o aplasia venosa, con carencia parcial o completa de las válvulas y varicosis atípica. Las malformaciones capilares intraóseas provocan hipoplasia ósea y hemangiomas cavernosos de la extremidad afectada.

Seldinger,

técnica de Técnica de canalización arterial mediante un alfiler metálico para la colocación de un catéter. Usada en el cateterismo del corazón izquierdo.

Schultze,

acroparestesia

de Trastorno vasomotor caracterizado por parestesia, anestesia, entumecimiento, y dolor en extremidades superiores. Los síntomas aparecen durante el descanso nocturno en el trayecto del nervio cubital. Es más frecuente en mujeres y se conoce también como **síndrome de Putnam** o **enfermedad de Wartenberg**.

Schwartz,

maniobra de Con el paciente en ortostatismo, el explorador coloca los dedos de una mano sobre una zona proximal del trayecto venoso y simultáneamente se percute sobre las dilataciones periféricas situadas en un área más distal. La percepción de una oleada sanguínea traduce insuficiencia del sistema valvular.

Sherman,
vena comunicante de Vena perforante en el medio de la pierna que comunica la vena safena interna con la vena tibial posterior.

Sneddon,
síndrome de Síndrome que asocia livedo reticularis, eventos isquémicos cerebrales, severo compromiso cutáneo que puede llegar a ulceraciones, hipertensión arterial y frecuentemente trombocitopenia. Presencia de anticuerpos antifosfolípido.

Solomon,
síndrome de Síndrome que asocia anomalías de los capilares arteriales y venosos en cualquier localización cutánea, malformaciones arteriovenosas del sistema nervioso central en asociación con anormalidades esqueléticas y nevus epidérmicos.

Stanford,
clasificación de Clasificación de la Universidad de Stanford para el manejo de la disección aórtica aguda:
Tipo A. Afectan a la aorta ascendente, con independencia del lugar del desgarro y de la extensión distal.
Tipo B. Afectan al cayado, a la aorta descendente, o ambos, pero no a la porción ascendente.

Stent
soporte Soporte metálico intraarterial que permite tras su colocación en un vaso mantener el flujo sanguíneo a través de él.

Stewart-Treves,
síndrome de Desarrollo de un linfangiosarcoma asociado a la presencia de un linfedema crónico de cualquier etiología. Inicialmente se describió en relación al linfedema postmastectomía.

Stuart,
síndrome de Síndrome de compresión externa de la arteria poplítea provocada por la inserción anómala de un haz tendinoso del músculo gastrocnemio interno. Provoca síntomas de claudicación intermitente llegando a causar dilataciones aneurismáticas y trombosis de la arteria.

Sturge-Weber,
enfermedad de Afección con escasa predisposición familiar que asocia un hemangioma en la hemicara superior, un angioma leptomeníngeo occipital homolateral y frecuentemente un angioma coroideo. Presenta progresivo deterioro neurológico con epilepsia, hemiparesia o hemiplejía.

Swan-Ganz,
catéter de Catéter con balón de flotación provisto de un sensor en la punta para medir parámetros como la presión o gasto cardiaco. Tras su introducción por

una vena periférica se hace avanzar hasta la aurícula derecha. Usado en el cateterismo del corazón derecho.

T

Takayasu,
enfermedad de Enfermedad inflamatoria de la aorta de probable origen autoinmune que cursa con la obliteración de uno o más troncos supraaórticos. La oclusión reduce el flujo sanguíneo en las áreas que irrigan dichos troncos. Puede aparecer marcadas estenosis arteriales con desaparición de pulsos carotídeo o de extremidades. Las estenosis carotídeas pueden producir fenómenos isquémicos cerebrales y oculares con síntomas neurológicos como afasia, hemiparesia transitoria, amaurosis, cefaleas, vértigo, etc. Pueden aparecer trombosis, afectación coronaria, aneurismas o estenosis de la arteria renal

con hipertensión. Es más frecuente en mujeres jóvenes, siendo su evolución progresiva. También llamada **síndrome de Martorell**.

Thompson,
operación de

Técnica quirúrgica paliativa del linfedema crónico. Anastomosis de los colectores linfáticos profundos del segmento afectado con los linfáticos superficiales retirando el tejido celular subcutáneo comprometido.

Tolosa Hunt,
síndrome de

Síndrome que asocia la afectación de los nervios motor ocular común, patético, primera rama del trigémino y motor ocular externo. Se produce por un aneurisma o trombosis del seno cavernoso y de la silla turca que invaden la pared externa del seno cavernoso.

Traube,
signo de

Ruido en pistoletazo del pulso femo-

ral que puede observarse en la insuficiencia aórtica.

Trendelemburg,
operación de

Ligadura de la vena safena para el tratamiento de las venas varicosas de la pierna.

Trendelemburg,
posición de

Con el paciente en decúbito supino se realiza elevación de las piernas y descenso del cabezal de la cama. Puede aparecer modificada realizando únicamente elevación de las piernas con lo que se consigue mejorar el retorno venoso. Usada en cirugía abdominal, pélvica, de extremidades inferiores, y estados de shock.

Trendelemburg,
test de

Test para venas varicosas que explora la normalidad de la válvula situada en la desembocadura de la safena interna en la vena femoral. Con el paciente en

decúbito supino se eleva la pierna varicosa hasta la desaparición de las varices. Posteriormente se coloca una ligadura elástica en el muslo ocluyendo la vena safena. Tras el paso a bipedestación las venas comienzan a llenarse desde su parte más distal por el retorno sanguíneo normal. Si al retirar la ligadura (tras 60 segundos) se produce un llenado instantáneo de las varices se considera el origen del trastorno en la válvula safeno-femoral. También llamado **test de Trendelenburg-Brodie**.

Trosseau,
síndrome de Síndrome paraneoplásico que cursa con episodios tromboembólicos consecuencia de la aparición de tromboflebitis. Estado de hipercoagulabilidad secundaria a la enfermedad maligna. También llamada tromboflebitis migratoria.

Turner,
síndrome de Síndrome de disgenesia gonadal debido a la ausencia o defecto del cromosoma X. Presenta malformaciones linfáticas (hipoplasia) congénitas con presencia de linfedema en el nacimiento que puede desaparecer posteriormente. Físicamente presentan talla baja, malformaciones faciales y torácicas y presencia de nevus melanocíticos.

V

Vierordt,
aparato de Primer aparato diseñado para la medición incruenta de la presión arterial, en el que se ponían pesos en conexión con una escala hasta que desaparecía el pulso por compresión de la arteria mediante un manguito hinchable. Precursor de los **esfigmomanómetros de von Basch y Riva-Rocci**.

Virchow,
ganglio de Adenopatía supraclavicular adherida a planos profundos e indurada, situada frecuentemente en el lado izquierdo y que traduce posibles metástasis ganglionares de un carcinoma torácico o abdominal.

Virchow,
triada de Hace referencia a las posibles causas de la trombosis venosa: éstasis venosa, aumento de la coagulabilidad sanguínea y alteración de la pared venosa.

Virchow-Robin,
espacios de Espacios perivasculares alrededor de arteriolas y arterias del sistema nervioso central.

Vieussens,
anillo oval de Engrosamiento muscular que enmarca a la fosa oval en la aurícula derecha.

Vieussens,
asa de Ramificación nerviosa que rodea la arteria subclavia por su parte inferior.

Volkman,
canales de Canales que perforan el periostio penetrando en el hueso compacto, por donde circulan los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Conectan los **canales de Havers** con el periostio.

Volkman,
contractura isquémica de Contractura muscular isquémica debido a una presión externa mantenida y a una necrosis tisular. Habitualmente ocurre en tras un traumatismo que condiciona la inflamación de las estructuras con compresión arterial o la aplicación incorrecta de un torniquete. Aparece contractura muscular que dificulta aún más el flujo arterial, dolor distal, parestesias y mano en garra.

Von Hippel

-Lindau,

síndrome de Síndrome de herencia autosómica dominante que asocia angiomas retinianos bilaterales con hemangioblastoma cerebeloso o medular, neoplasias en diferentes órganos y ocasionalmente una malformación vascular capilar facial. También llamado **angiomatosis retino-cerebelosa**.

W

Waldeyer,

anillo de Anillo de tejido linfático localizado en orofaringe y nasofaringe. Tiene una función inmunológica que realiza mediante la inducción de una respuesta humoral sérica frente a antígenos patógenos.

Warren,

intervención de 1. Técnica quirúrgica derivativa para

reducir la presión del sistema portal. Anastomosis espleno-renal distal.

2. Técnica quirúrgica para reducir las varices gástricas en hipertensión portal mediante ligadura de la vena gástrica izquierda.

Weber,

flebectasia de Aumento del volumen de los vasos arteriales y venosos de una región corporal sin trascendencia clínica.

Wegener,

granulomatosis de Vasculitis necrosante granulomatosa en arterias pequeñas y vénulas de diversos órganos, en especial, vías respiratorias altas, pulmón y riñones (glomerulonefritis focal). Proceso de naturaleza inmune del cual se desconoce el agente causal que afecta a personas de mediana edad.

Westermark,

signo de Aparición de oligohemia regional en la radiología del TEP masivo.

Williams,

síndrome de Forma de hipercalcemia infantil que asocia estenosis aórtica supraavicular.

Willis,

polígono de Círculo anastomótico arterial localizado en la base del cerebro que asegura la circulación a todas las áreas del cerebro incluso cuando la carótida o las arterias vertebrales están ocluidas. Se forma a partir de ramas de la arteria carótida interna, arterias cerebrales anterior y posterior media y arterias comunicantes posteriores.

Wyburn

-Masson,

síndrome de Afección neurocutánea no hereditaria que asocia una malformación arterio-

venosa retiniana unilateral, una malformación arterio-venosa aneurismática intracraneal, aneurismas carotídeos y una malformación capilar en la región ocular. También conocido como **síndrome de Bonnet-Dechaume-Blanc** o angiomatosis neuroretiniana.

Z

Zuckerkindl,

órgano de Paraganglios situados en la parte anterior de la superficie de la aorta en su trayecto por retroperitoneo. Asociados a actividad simpática, pueden ser origen de tumores neuroendocrinos. Llamados también **cuerpos de Zuckerkindl**.

ESBERIVEN

ESBERIVEN. Extracto de *Melilotus officinalis* y Troxerutina. **1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: ESBERIVEN**, solución. **2. COMPOSICION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA:** Cada 3,5 ml contienen: Extracto estandarizado de *Melilotus officinalis*, equivalente a 3,5 mg de Cumarina (1 mg/ml); Troxerutina (DOE), 0,35 g (0,1 g/ml). **3. FORMA FARMACÉUTICA:** Solución hidroalcohólica. **4. DATOS CLINICOS:** **4.1 Indicaciones terapéuticas:** Alivio a corto plazo (de dos a tres meses) del edema y síntomas relacionados con la insuficiencia venosa crónica. **4.2 Posología y forma de administración:** * **Adultos:** Como dosis media para adultos se recomiendan 3,5 ml, 3 veces al día. Este medicamento puede ingerirse mezclado con un poco de leche fría con o sin azúcar, zumo o refresco de frutas o agua azucarada. Es posible que aparezcan molestias gastrointestinales con la toma de este preparado; si esto ocurriese, debería ser considerada la posibilidad de administrar el fármaco junto con los alimentos. Aunque los efectos favorables se presentan pronto el tratamiento no debe abandonarse. La dosis debe ser mantenida hasta la remisión de los síntomas o del edema, generalmente 2 a 3 meses. Dado que el alivio de los síntomas se produce habitualmente en este tiempo, el tratamiento puede entonces ser interrumpido y reinstaurado a la misma posología cuando los síntomas vuelvan a reaparecer. No es necesario modificar el régimen terapéutico en pacientes con insuficiencia renal, hepática o en ancianos. * **Niños:** La especialidad ESBERIVEN no es adecuada para la administración en niños menores de 18 años y por lo tanto, no debería ser utilizada en este grupo de edad. **4.3 Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a este mismo medicamento o a alguno de los componentes del mismo. Los niños menores de 18 años no deben utilizar este medicamento. **4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:** Deberá realizarse un especial control clínico en pacientes con úlcera gastroduodenal, hemorragia grave o trombo-citopenia. El extracto de *Melilotus officinalis*, como cualquier extracto de plantas, puede variar de tonalidad de color de un lote a otro o incluso formar pequeños posos con el tiempo, lo cual se puede observar ocasionalmente en ESBERIVEN®, sin que ello suponga ninguna variación en la concentración de sus principios activos. **Advertencia sobre excipientes:** Este medicamento contiene 20% de etanol en volumen final. Cada dosis de 3.5 ml, contiene 0,574 g de etanol lo que puede ser causa de riesgo en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Puede potenciar el efecto de otros medicamentos. **4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:** No se han descrito. **4.6 Embarazo y lactancia:** **Embarazo:** No se han realizado estudios adecuados sobre la administración de Esberiven en mujeres embarazadas. Sin embargo, estudios llevados a cabo en diversas especies animales no han demostrado efectos teratogénos ó fetotóxicos a dosis muy por encima de la terapéutica en humanos. La administración de Esberiven en mujeres embarazadas se realizará valorando siempre la relación beneficio-riesgo de su aplicación. **Lactancia:** Existe paso de los principios activos a la leche materna, debido a las propiedades fisico-químicas de éstos. Respec-

to a la cumarina y a la 7-hidroxycumarina, la cantidad que pasa a la leche materna corresponde al 3% de la dosis. La administración de Esberiven en mujeres lactantes se realizará valorando siempre la relación beneficio-riesgo de su aplicación. **4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinaria:** Es improbable que este medicamento afecte de forma negativa la capacidad de conducir vehículos o de utilizar maquinaria peligrosa. **4.8 Reacciones adversas:** Los efectos adversos de este medicamento son, en general, infrecuentes, leves y transitorios. Los efectos adversos más característicos son: alteraciones digestivas (<<1%) como dispepsia, náuseas, molestias abdominales; cefalea y erupciones exantemáticas. **4.9 Sobredosificación:** En caso de ingesta accidental: lavado gástrico y tratamiento sintomático. No existe antídoto específico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20. **5. DATOS FARMACEUTICOS: 5.1 Relación de excipientes:** Etanol (20% v/v); Metilparabeno, Agua purificada. **5.2 Incompatibilidades:** No se han descrito. **5.3 Período de validez:** 5 años. **5.4 Precauciones especiales de conservación:** Consérvese en lugar fresco y seco. **5.5 Naturaleza y contenido del recipiente:** Frasco de 200 ml y medida dosificadora. **5.6 Instrucciones de uso y manipulación:** No proceden. **5.7 Nombre o razón social y domicilio permanente o sede del titular de la autorización de comercialización: Titular:** IQUINOSA FARMA, S.A. C/Alpedrete, 24. 28045 Madrid. **Responsable de la fabricación:** FAES FARMA, S.A. C/ Máximo Aguirre, 14. 48940 Lejona, Vizcaya. **5.8. Texto revisado:** Marzo 2003. **6. PRESENTACION Y P.V.P. (IVA):** Frasco de 200 ml y tapón dosificador: 8,57 € **BIBLIOGRAFÍA:** **1.** IMS. Estudio de Prescripciones Octubre-Diciembre 2004. **2.** Hladovec J. Vasotrope Arzneistoffe – ein Überblick auf der Basis eines vereinheitlichenden Konzepts ihres Wirkungsmechanismus. *Arzneim. Forsch* 27 (1977) 1073-6. **3.** Hladovec J. Eine rationale Begründung zur Anwendung von endothel-protectiven Substanzen bei peripherer Ischämie. In: Reinis Z. et al. (Hrsg.): XI. Intern. Angiologie-Kongreß, Prag, 1978, Springer – Verlag (1980) 134-135. **4.** Radtke H. et al. Die rheologische Wirksamkeit von Cumarin und Troxerutin. *Therapiewoche* 33 (1983) 6662-6666. **5.** Clodius L. et al. Eine neue Methode zur Herbeiführung eines numerisch erfaßbaren Gan – graans am Kaninchenohr. Die Therapeutische Wirkung einer Behandlung mit Benzopyronen. *Schweiz. Rundschau. Med. (Praxis)* 65 (1976) 514-518. **6.** Simic L. et al. Die Behandlung des Ulcus cruris mit einem Benzopyron-Präparat. *Der informierte Arzt* 13 (1985) 14-20. **7.** Zucarelli F. Efficacité clinique et tolerance de la coumarine rutine. Etude contrôlée en double aveugle versus placebo, *Gazete Medicale*, 94:80 - 86, 1987. **8.** Blume L, de las Hays, R. Increased efficacy of intermittent compression treatment by adjuvant medication. *Phlebol Proktol* 172:53 - 56, 1988.